

benta 480 sl

Bentazone (Μπενταζόν)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70290/31.07.2018

Εγγυημένη Σύνθεση του σκευάσματος:

Bentazone 48% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 58,75 % β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Το BENTA 480 SL είναι μεταφωτρωτικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής. Δρα με την αναστολή της φωτοσύνθεσης (φωτοσυστήματος II). Το δραστικό συστατικό απορροφάται κυρίως από τα πράσινα μέρη των φυτών και δρα ως αναστολέας της φωτοσύνθεσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Bentazone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία. Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας και μπότες κατά την ανάμιξη/φύρτωση καθώς και κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι, εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Κάτοχος της άδειας:
Sharda Cropchem Espana S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina no 3, 12th Floor,
30006 Murcia-Ισπανία



Sharda Cropchem

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μπαϊρακτάρη 5 11526, Αθήνα Τηλ.: 210 6921332

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκέυασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** ή αφήστε μίαν ασέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** από μη γεωργική ύλη.

Πρώτες βοήθειες - Αντιδοτό:

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Σε περίπτωση εισπνοής επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος – Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής:

Αραβόσιτος (ZEAMX): Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*-POLPE), Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*-AMARE).

Δόση σκευάσματος: 200 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμόζεται χωρίς μεταφωτρωτικά όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-5 πραγματικών φύλλων (BBCH 10-15).

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 15-40.

Ρύζι (ORYSA): Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*-XANST), Αγριομαμακιά (*Abutilon theophrasti*-ABUTH), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*-SINAR), Αναγαλιές (*Anagallis arvensis*-ANGAR), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*-POROL), Βούτιο (*Butomus umbellatus*-BUTUM), Ζωγός (*Sonchus asper*-SONAS), Κίτρινη Κύπερη (*Cyperus esculentus*-CYPES), Λινδέρνια (*Lindernia sp*-LIDSS), Μοσχοκύτερη (*Cyperus difformis*-CYPDI),

Ρανούνουλος (*Ranunculus sardous*-RANSA), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*-RAPRA), Πεντάνευρο (*Allisma spp*), Σκίρπο ή Ραγάδι (*Scirpus maritimus*-SCPM, *S. mucronatus*-SCPMU), Σπέργουλα (*Spergula arvensis*-SPRAR), Τάτουλας (*Datura stramonium*-DATST)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*-AMARE), *Bidens sp*-BIDSS, Δωδεκάνθι (*Lamium alexicaule*-LAMAM), Ιπόμοια (*Ipomoea sp*-IPOSS), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*-PAPRH), Πεντάνευρο (*Alisma plantago-aquatica*-ALSPA), Πολυκόμμι (*Polygonum convolvulus*-POLCO), Στύφνος (*Solanum nigrum*-SOLNI).

Δόση σκευάσματος: 200 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμόζεται μεταφωτρωτικά από το 3^ο φύλλο της καλλιέργειας έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 13-29).

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-50.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις:

1. Πριν την εφαρμογή στο ρύζι, θα πρέπει να μειώνεται η στάθμη του νερού στα τηγάνια ως 2-3 εκ. να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν ελέγχονται ζιζάνια που κατά το χρόνο της εφαρμογής βρίσκονται κάτω από το νερό.

2. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκέυασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με καλή διαβροχή των ζιζανίων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυτίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τριεξ (3) φορές με καθαρό νερό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκέυασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογενείς ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκέυασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Στον αραβόσιτο, να αποφεύγεται ο ψεκασμός με ψυχρό καιρό ή ξηρασία ή όταν αναμένεται βροχή μέσα σε 5-6 ώρες.

Προστασία καταναλωτών. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):

Αραβόσιτος, Ρύζι: Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του προϊόντος (χωρίς μεταφωτρωτικά).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.: βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

1 ΛΙΤΡΟ