

Πρώτες βοήθειες - Αντιδοτό: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΙΣΤΗΝΟΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες τους για μια ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ανήκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επηρεαζόμενα ύδατα για τις δενυλόμενες καλλιέργειες και την ελιά, **20 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπέλου και **10 μέτρων** για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια ανήκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη. Επικινδύνει για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύμημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστρέψουν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεπ φρούτ, Νεράτζια): i) Αφίδες (*Myzus persicae*) με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Λεκανίο (*Saissetia oleae*), Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*), Αλευρώδης (*Aleurothrips floccosus*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 1 εφαρμογή.

Ακρόδρυα, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά: i) Αφίδες (*Hyalopterus* spp.) με 30 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-50 κ.ε. σκευ. σε 140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Καρπόκαψα Καρυδιάς (*Laspeyresia pomonella*), Καρπόκαψα Καστανιάς (*Laspeyresia splendana*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών, iii) Ευρύτομο (*Eurytoma plotiniconi*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την έναρξη των πτήσεων των ακμίων. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): i) Καρπόκαψα μηλιάς (*Laspeyresia pomonella*), Αφίδες (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*), Ψύλλα (*Psylla*

rolecti 2,5 EC

**Deltamethrin (Δελταμεθρίν)
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14408/10-12-2012

Εγγυημένη Σύνθεση: Deltamethrin 2,5% (β/ο), Βοηθητικές ουσίες 97,13 % (β/β). Περιέχει αρωματικό διαλύτη Νάφθα.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαλύσεις των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα/οπινθίδες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. -Μην καπνίζετε. Α

ποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μπαϊρακτάρη 5, 11526,
Αθήνα Τηλ.: 210 6921332



Sharda Cropchem

1 ΛΙΤΡΟ

mal), Ανθόντομος (*Anthonomus pomorum*, *A. spilotus*). Μυλοκόνηθ (*Melolontha melolontha*), Κηκιδόμυγες (*Dasiuneta mali*), Θρίπες (*Thrips* spp.) με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες. ii) Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*) με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες. iii) Ψύλλα αχλαδιάς (*Psylla pyri*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες. iv) Ψύρα Σαν Ζοσέ (*Quadrastipitoides periclosus*) με 50-70 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών. 1 εφαρμογή. **Κυδωνιά , Μουσουλιά:** i) Καρπόκαψα μηλιάς (*Laspeyresia pomonella*) Αφίδες (*Aphis pomi* , *Dysaphis plantaginea*) **Ψύλλα μηλιάς (Psylla mali)** με 30-50* κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών.ii) **Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana ,Archips rosanus):** με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών.iii) **Ψύλλα Αχλαδιάς (Psylla pyri):** με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά): i) Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*), Ανάροια (*Anarsia lineatella*) με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-49 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολετίδα ή μύγα κερασίου (*Rhagoletis cerasi*) με 40-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα της μεσογείου (*Ceratitis capitata*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Αφίδες (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Hyalopterus pruni*), Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Laspeyresia funebrana*) με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. v) Ψύρα Σαν Ζοσέ (*Quadrastipitoides periclosus*) με 50-70 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών. 1 εφαρμογή.

Βυσανίαι: i) Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana* , *Archips rosanus*), Ανάροια (*Anarsia lineatella*) με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-49 κ.ε. σκευ. σε 100 -140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολετίδα ή μύγα κερασίου (*Rhagoletis cerasi*) με 40-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-70 κ.ε. σκευ. σε 100 -140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100 -140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. iv) Αφίδες (*Myzus persicae* , *Myzus cerasi* , *Hyalopterus pruni*) Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς (*Laspeyresia funebrana*) : με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών. 1 εφαρμογή.

Αμυγδαλί: i) Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*) με 50 κ.ε. σκευ. (1η γενιά) & 50-70 κ.ε. σκευ. (2η και 3η γενιά)/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κογχυλίδα (*Clysis ambigua*) με 50-70 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Τζιτ(κιάκια (*Empoasca* spp.), Αφίδες Πυραλίδα (*Sparganothis pilleriana*), Τσιγαρολόγος (*Byctiscus betulae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/14 ημέρες.

Ελιά: i) Δάκος (*Bactrocrea oleae*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμιαίων στις παγίδες, ii) Λεκανίο (*Saissetia oleae*), Θρίπες (*Thrips spp.*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.iii) Βαμβακάδα (Ευρυφύλλα spr.) : με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών iv) Πυρρινότροτης (*Pryas oleae*) με 30 κ.ε. (ανθόβ.) ή 50 κ.ε. (καρποβ.) σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Στην έναρξη της ανθώσης (ανθόβια γενέα) και αμέσως μετά την καρποδότηση (καρποβία γενέα) μεταξύ υδωσείας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμιαίων στις φερονικνικές παγίδες. 1 εφαρμογή/7 ημέρες.

Φρούλα (Υ+Θ): Αφίδες (*Aphis spp.*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/14 ημέρες.

Κρεμμύδι, Πράσο, Καρότο: Αφίδες (*Aphis spp.*), Θρίπες (*Thrips tabaci*), Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 40-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/14 ημέρες.

Σκόρδο: Θρίπες (*Thrips tabaci*) Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 40-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών. 3 εφαρμογές/14 ημέρες.

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (Υπαιθρου), Πιπεριά (Θερμοκηπίου): i) Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσα (*Nezara viridula*) με 30 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-30 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 18-42 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης (*Trialeuroides varogariourum*) με 70 (Θ) κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-70 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής, 3 εφαρμογές/14 ημέρες (Υ) & 4 εφαρμογές/7 ημέρες (Θ).

Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου): i) Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσα (*Nezara viridula*) με 30 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-42 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/7 ημέρες (Θ).

Αγγούρι (Υπαιθρου & Θερμοκηπίου), Αγγουράκι (Υ+Θ), Κολοκυθάκι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ): i) Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Αφίδες (*Aphis spp.*, *Hyperomyzus lactucae*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/7 ημέρες.

Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο: i) Πιερίδα (*Pieris spp.*), Μαμίστρα (*Mamestra brassicae*), Πλούζια (*Plusia gamma*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) Αφίδες (*Myzus persicae*, *Brevicoryne brassicae* .) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Πλουτέλλα (*Plutella spp.*) με 50 κ.ε. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές/14 ημέρες.

Μαρούλι (Υ): i) Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Άλτηρ (*Chrysodeixis chalcites*), Αφίδες (*Aphis spp.*, *Hyperomyzus lactucae*, *Nasonovia bibisipii*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/7 ημέρες.

Μαϊντανός, Φύλλα Σέλινου, Ρόκα: i) Αφίδες (*Aphis spp.* κα.), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Μαμίστρα (*Mamestra brassicae*), Άλτηρ (*Chrysodeixis chalcites*) με 50 κ.ε.

σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.ε. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές/14 ημέρες.

Ώστρια (Φασόλι, Κουκιά): Πράσινο ακουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis spp.*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 25-30 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της ανθώσης (BBCH 00-60). 2 εφαρμογές/14 ημέρες.

Φακή, Ρεβίθια: Πράσινο ακουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis spp.*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. Σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών. 2 εφαρμογές/14 ημέρες.

Μπιζέλι: i) Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σιτόνα (*Sitona spp.*) με 25 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδα των κουκιών (*Aphis fabae*), Κάμπιες (*Laspeyresia spp.*), Θρίπες (*Thrips tabaci*, *Thrips angusticeps*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές/14 ημέρες.

Αγκινάρα: i) Κασσιόδα (*Cassida spp.*) με 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Προντένια (*Spodoptera spp.*), Αφίδες (*Anuraphis cardui*, *Myzus persicae*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/7 ημέρες.

Σπαράγγι: Αφίδες, Θρίπες (*Thrips tabaci*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές/7 ημέρες.

Μανιτάρια: Λίπτερα Κολλέμβολα) με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 1 εφαρμογή.

Πατάτα: i) Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*) με 50 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/14 ημέρες.

Βαμβάκι: i) Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*), Πράσινο ακουλήκι (*Helicoverpa armigera*) με 50-70 κ.ε. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*), Τζιτζικάκια (*Empoasca spp.*) με 50 κ.ε. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Αφίδα (*Aphis gossypii*), Θρίπες (*Thrips tabaci*), Λύγγος (*Lygus spp.*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές/14 ημέρες.

Καπνός: Αφίδες, Θρίπες (*Thrips tabaci*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*), Επιτρίε (*Epitrix spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/7 ημέρες.

Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι: i) Αφίδες (*Aphis fabae*, *Myzus persicae*) Μύγα των τευτλών (*Pegomita spp.*) Άλτηρ (*Chaeotacema tibialis*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σκαθάρι (*Lixus spp.*), Κλεονός (*Cleonus mendiculus*), Κασσιόδα (*Cassida nebulosa*) με 50 κ.ε. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών. 1 εφαρμογή.

Αραβότοπος:** i) Πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Σεξάμια (*Sesamia spp.*), Πράσινο ακουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*) Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Διοβρώτικα (*Diabrotica virgifera*) με 50 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/7-14 ημέρες.

Σιτάρι, Κριθάρι: Αφίδες, Θρίπες, Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*), με 25-30 κ.ε. σκευ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 1-2 εφαρμογές/21 ημέρες.

Βρώμη, Σίκαλη: Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*) Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 40-60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών. 1 εφαρμογή.

Μηδική: Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*) Σκαθάρι των μπιζελιών (*Apion risi*) Φυτονόμος (*Hypera postica*) με 25κ.ε. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών. 2 εφαρμογές/14 ημέρες

Σόγια: i) Άλτηρ (*Chaeotacema tibialis*), Κοκκισκούλη (*Agrotis spp.*), Νεζάρα (*Nezara viridula*) με 30 κ.ε. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδες με 50 κ.ε. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της ανθώσης (BBCH 00-60). 2 εφαρμογές/14 ημέρες.

Ελαιοκάρβυνη: i) Άλτηρ (*Chaeotacema tibialis*), *Meligetes spp.*, Αφίδες (*Brevicoryne brassicae*), Σκαθάρι (*Euthorhynchus spp.*) με 30 κ.ε. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της ανθώσης (BBCH 00-60). 1 εφαρμογή.

Καλλωπιστικά (Υπαιθρου & θερμοκηπίου): i) Αφίδες (*Myzus persicae*), Θρίπες (*Thrips tabaci*), Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*), Μηλόδηλος (*Melolontha melolontha*), Κάμπια γαρυφύλου (*Cacaecimorpha pronubana*) με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλόδετες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosana*, *Pandemis spp.*) με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 17-5 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης (*Trialeuroides varogariourum*) με 70 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 3 εφαρμογές/7 ημέρες.

Παρατήρησης: ΠΡΟΣΟΧΗ:- Στα μπιλιόδη (Κυδωνία και Μουμουλιά) η δόση των 50 κ.ε. σκευασμάτος/100 λίτρα ψψ. πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.ε. σκευασμάτος στο στρέμμα. ***Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελοφύλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φ.π.* Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβότοπο οδηγεί στη μείωση των επιβλαστών των μυκοτόξινων, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων Ostrinia sp. και Sesamia sp.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοϋγειας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποβλασταί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: 1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων να και μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολυτώς απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. 2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. 3. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται τις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφανείας με το ψεκαστικό υγρό. 4. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. 5. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικεμνοφόρου πλάκας ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνουνται με σκευασμάτα διαφορετικής ομάδας.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματός.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα:-

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό τις συνηθισμένες καλλιέργειες δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Πορτοκάλι, Μανταρίνι, Λεμονιά, Λεμόνι, Φρούτι, Νεράι, Αμύγδαλο, Φαστίκι, Φουντούκι, Καρυδιά, Κασταλιά, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι, Αραβότοπος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, 30. Μηδική: 14. Μηλιά, Αγλαδία, Κυδωνία, Μουμουλιά, Βερικοκιά, Ροδοκινία, Κερασιά, Δ. αγκισφιά, Βυσσινιά, Αμπέλι, Ελιά, Κρεμμύδι, Πράσο, Καρότο, Σκόρδο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαϊντανός, Φύλλα Σέλινου, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλι, Πατάτα, Καπνός, 7. Φράουλα (Υ+Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Αγγουράκι (Υ+Θ), Κολοκύθη (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Μαρούλι (Υ), Ρόκα, Αγκινάρα, Μανιτάρια: 3. Φασόλι, Κουκιά, Σπαράγγι, Ελαιοκάρβυνη. Σόγια: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευασμάτος. Καλλωπιστικά (Υ+Θ): Μη εφαρμοζόμια.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος: Διατηρείστε το στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ:- βλέπε επί της συσκευασίας

