

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φρακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας (φιάλες και δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Πεδίο εφαρμογής-Στόχοι-Δόσεις: ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά), ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Φράουλα), ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Τομάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Κολοκύθι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλια, Αρακάς), ΟΞΥΡΙΑ (Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια), ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (Σόγια, Ηλιανθος, Βαμβάκι), ΠΑΤΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ (Ζαχαρότευτλα, Καπνός, Μηδική), ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Για i) Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια (1α) με 100-150 κ.εκ./στρέμμα & ii) Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια (1β) με 200-300 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-40.

Χρόνος εφαρμογής: Μεταφωτοτοκικά από το στάδιο των 2-3 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις: (1) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια: (α) Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: *Alopecurus* spp. (Αλεπονουρές), *Apera spicaventi* (Ανεμόχορτο), *Bromus* spp. (Βρώμη), *Dactylis* spp. (Δ ακτυλίδες), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα), *Eleusine indica* (Ελευσίνη), *Hordeum* spp. (Καρβάρια), *Lolium* spp. (Ηρες), *Phalaris* spp. (Φαλαρίδες), *Panicum* spp. (Πάνικο), *Setaria* spp. (Σετάριας), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από σπόρο), *Triticum* spp. (Σιτάρια). (β) Πολυετή Ζιζάνια: *Agropyron repens* (Αγρόπυρο), *Agrostis stolonifera* (Αγρωστis), *Cynodon dactylon* (Αγριάδα), *Paspalum* spp. (Πάσπαλο), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από ριζώματα). (2) Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα. (3) Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.

quizalofop-p-ethyl sharda balkan 5 ec

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Quizalofop-p-ethyl (Κουίζαλοφ-π-εθύλ)

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ): 7808/9-1-2007

Εγγυημένη Σύνθεση:

Quizalofop-p-ethyl 5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 94,60% β/β

Διασυστηματικό, μεταφωτοτοκικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια. • Πλύνετε τα χέρια σας

αοχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της έγκρισης:

SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Μπαιρακτάρη 5, 11526 Αθήνα, Τηλ. 210 6921332

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Μπαιρακτάρη 5, 11526 Αθήνα, Τηλ. 210 6921332

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.: βλέπε επί της συσκευασίας



Sharda Cropchem

1 ΛΙΤΡΟ

(4) Χρόνος Εφαρμογής: Τα *Cynodon dactylon* καταπολεμούνται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15-20 εκατοστά. Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 45-50 εκατοστά. Η Ροα ανηψα (ετήσια Πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1-4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμμα. (5) Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι ευρώστες. **Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:** • Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γεωτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. • Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιήσετε άλλο φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του. ii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα ¾ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας και πρέπει να αποφεύγεται.

Φυτοτοξικότητα: Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Κολοκύθι: 7. Μηδική, Μαρούλι, Σπανάκι, Καρότο, Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια: 21. Ηλιανθος, Καπνός, Μηλιά, Ροδακινιά, Πατάτα, Φασόλι, Φράουλα: 35. Ραδίκια, Μπιζέλια, Σκόρδο: 49. Τομάτα, Λάχανο, Πεπόνι, Πιπεριά: 56. Ζαχαρότευτλα, Σόγια: 60. Αρακάς, Κρεμμύδι, Σέλινο: 70. Βαμβάκι: 80. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Στην αρχική του απараβίαση τη συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και τη άμεση έκθεση του στο ηλιακό φως. Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

